

Abound®

Descripción

Módulo de glutamina, arginina e β -hidroxi- β -metilbutirato cálcico (CaHMB)

Perfil nutricional

- Aporte calórico: 89 kcal por sobre
- Relación kcal no proteicas/g de Nitrógeno: 8,4/1
- Osmolaridad: 407 mOsm/l (un sobre en 250 ml de agua)
- Sin gluten. Sin lactosa (no apto para galactosémicos)

Módulo para facilitar facilitar la cicatrización de heridas

Sugerencia de uso

- Úlceras por presión
- Úlceras del pie diabético
- Úlceras venosas de miembro inferior
- Quemaduras
- Heridas quirúrgicas



Abound®

Análisis aproximado	Unidades	por 100 g	por 24 g
Valor energético	kcal/kj	372/1556	89/374
Proteínas	g	61,7	14,8
L-Arginina	g	30,8	7,4
L-Glutamina	g	30,8	7,4
Carbohidratos	g	27,1	6,5
Azúcares	g	4,6	1,1
HMB*	g	5,4	1,3
Grasas	g	0,1	0,02
Saturadas	g	0,1	0,02
Fibra	g	0	0
Minerales			
Calcio	mg	896	215
Sodio	mg	<15	<15

* β -hidroxi- β -metilbutirato

1,55 g de Ca-HMB proporcionan 1,3 g de HMB por 24 g

Administración oral

1. Diluir un sobre de Abound® en 250 ml de agua y remover hasta la completa disolución del polvo.
2. No diluir Abound® en líquidos calientes o hirviendo.

Administración por sonda

1. No mezcle Abound con otras fórmulas enterales en la bolsa de alimentación por sonda.
2. Vierta un paquete de Abound en un recipiente adecuado y añada agua (125 ml) a temperatura ambiente.
3. Mezcle bien hasta que se disuelva por completo.
4. Compruebe la colocación adecuada de la sonda de alimentación.
5. Vierta 30 ml de agua para lavar la sonda de alimentación antes de la administración de Abound.
6. Administre Abound a través de la sonda de alimentación usando una jeringa de 60 ml o mayor.
7. Después de la administración de Abound, administre 30 ml adicionales de agua (puede usarse una cantidad menor de agua para lavar el tubo si el paciente tiene una dieta restringida a líquidos).

Presentaciones	Sabor	C. Nacional
Sobre de 24 g x 30 unidades	naranja	162357.7