

## BULA DO PACIENTE

### I) IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO

# Vibral<sup>®</sup>

## dropropizina

### APRESENTAÇÕES

VIBRAL<sup>®</sup> Xarope Adulto (3 mg/mL): frasco de 120 mL e 1 copo-medida.

VIBRAL<sup>®</sup> Xarope Pediátrico (1,5 mg/mL): frasco de 120 mL e 1 copo-medida.

### VIA ORAL

### USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 2 ANOS

### COMPOSIÇÃO

Cada mL de VIBRAL<sup>®</sup> (dropropizina) xarope contém:

dropropizina ..... 3 mg

Excipientes: benzoato de sódio, ácido benzoico, sacarose, ácido cítrico monoidratado, corante vermelho ponceaux , aroma de framboesa, água purificada.

Cada mL de VIBRAL<sup>®</sup> (dropropizina)xarope pediátrico contém:

dropropizina ..... 1,5 mg

Excipientes: benzoato de sódio, ácido benzoico, sacarose, ácido cítrico monoidratado, corante vermelho ponceaux , aroma de framboesa, água purificada.

### II) INFORMAÇÕES AO PACIENTE

#### 1) PARA QUÊ ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

VIBRAL<sup>®</sup> é indicado para o tratamento dos sintomas da tosse irritante e seca (sem secreção).

#### 2) COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

VIBRAL<sup>®</sup> é um medicamento contra tosse que age bloqueando os receptores da tosse. Apresenta uma discreta ação antialérgica, podendo ser usado no tratamento da tosse associada à condição alérgica.

A dropropizina é rapidamente absorvida pelo trato gastrointestinal, com início de ação entre 15 a 30 minutos após a sua administração por via oral (por boca).

#### 3) QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

**Este medicamento é contraindicado para crianças menores de 2 anos de idade.**

**Este medicamento é contraindicado para uso por pacientes com alergia à dropropizina ou a qualquer componente da formulação, insuficiência respiratória grave, hipotensão (queda da pressão arterial), em pacientes asmáticos e em casos de tosse produtiva (com secreção).**

#### **4) O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**

O tratamento com VIBRAL<sup>®</sup> deve ter a duração mais curta possível, geralmente poucos dias. Se os sintomas persistirem, você deverá procurar o seu médico para ser reavaliado.

**Capacidade de dirigir ou operar máquinas:** Os pacientes com sensibilidade aumentada à dropropizina devem ter cuidado ao dirigir veículos ou operar máquinas, devido à possibilidade de hipotensão (queda da pressão arterial) ou sonolência.

**Alterações nos rins e fígado:** VIBRAL<sup>®</sup> deve ser usado com cuidado em pacientes com alteração da função dos rins ou do fígado.

**Uso em idosos:** VIBRAL<sup>®</sup> deve ser usado com cuidado em idosos.

**Uso em crianças:** É recomendável que o uso de antitussígenos em crianças de 2 a 6 anos seja limitado.

**Gravidez e lactação:** VIBRAL<sup>®</sup> não deve ser utilizado durante a gravidez e a amamentação, exceto sob orientação médica.

**Informe seu médico se ocorrer gravidez ou iniciar amamentação durante o uso deste medicamento.**

**Atenção diabéticos: contém açúcar.**

#### **INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS**

O uso do VIBRAL<sup>®</sup>, com álcool e com depressores do Sistema Nervoso Central, como medicamentos para o tratamento de insônia, ansiedade e alguns analgésicos, pode levar a um aumento dos efeitos colaterais da dropropizina, como a hipotensão e a sonolência.

**Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.**

#### **5) ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?**

Conservar em temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C) e proteger da luz.

**Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.**

**Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.**

VIBRAL<sup>®</sup> é apresentado sob a forma de solução límpida, livre de impurezas, de cor vermelho-cereja, sabor e odor de framboesa.

**Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.**

**Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.**

**6) COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**

**VIBRAL® xarope adulto (3 mg/mL):**

**Adultos e crianças maiores de 12 anos:** 1 copo-medida (10 mL), 4 vezes ao dia.

**VIBRAL® xarope pediátrico (1,5 mg/mL):**

**Crianças de 2 a 3 anos:** ¼ a ½ copo-medida, 4 vezes ao dia.

**Crianças acima de 3 anos:** 1 copo medida, 4 vezes ao dia.

**Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião-dentista.**

**7) O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Em caso de esquecimento esperar até o horário de tomada da próxima dose. Não tomar mais do que a dose normal recomendada.

**Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.**

**8) QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?**

As reações adversas raramente são observadas nas doses recomendadas. No caso de uso em doses mais altas ou de sensibilidade aumentada à dropropizina, as reações mais frequentes são hipotensão (queda da pressão arterial), náusea, sonolência e eritema (vermelhidão da pele).

**Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.**

**9) O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?**

Os sintomas da superdosagem de VIBRAL® são hipotensão (queda de pressão arterial), náusea e sonolência. Não existe antídoto específico. O tratamento usual da superdosagem aguda é a provocação do vômito, o mais precocemente possível, a não ser que o paciente esteja inconsciente. No hospital, a lavagem gástrica somente é útil se aplicada precocemente, devido à rápida absorção intestinal da dropropizina.

**Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.**



Abbott Laboratórios do  
Brasil Ltda  
Rua Michigan, 735  
São Paulo, Brasil  
CEP: 04566-905  
T: (11) 5536-7000  
F: (11) 5536-7345

### III) DIZERES LEGAIS

MS: 1.0553.0348

Farm. Resp.: Graziela Fiorini Soares -  
CRF-RJ nº 7475

**Registrado por:** Abbott Laboratórios do Brasil Ltda.  
Rua Michigan, 735  
São Paulo – SP  
CNPJ 56.998.701/0001-16

**Fabricado por:** Abbott Laboratórios do Brasil Ltda.  
Rio de Janeiro – RJ  
INDÚSTRIA BRASILEIRA

**Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas procure orientação médica.**

**BU19**

**ABBOTT CENTER**  
Central de Relacionamento com o Cliente  
0800 703 1050  
[www.abbottbrasil.com.br](http://www.abbottbrasil.com.br)

**Esta bula foi aprovada pela Anvisa em 04/05/2020.**

